

Koronaviruslääkityksen tarpeen arviointi

31.10.22

Koronavirusinfektioon on olemassa lääke (Paxlovid), joka on kohdennettu valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan riskiryhmille. Lääke ei paranna koronavirusinfektiota, vaan pyrkii estämään, että riskiryhmiin kuuluvilla tauti ei etenisi vaikeaksi. Lääkitys annetaan terveydenhuollosta ja on potilaalle maksuton.

Alla olevasta listasta voit tarkistaa kuulutko riskiryhmään, jolle Paxlovid-lääkettä pitää harkita. Jos kriteerit kohdallasi täyttyvät ja olet halukas, että lääkäri arvioi Paxlovid-lääkityksen aloituksen tarpeen, ole yhteydessä PPKY Kallion pandemiakoordinaattoriin: puh. 040-635 5052 arkisin klo 9–15.

Kaikkien 5 kohdan on täyttyvä:

1. Sinulla on oireinen COVID-tartunta
2. Tauti on varmistettu terveydenhuollossa tehdyllä PCR- tai Antigeenitestillä
3. Oireiden alkamisesta on alle 5vrk (hoito tulee aloittaa 5 vrk:n kuluessa oireiden alkamisesta)
4. Olet yli 18-vuotias

JA

5. Kuulut johonkin alla mainituista vaikean koronavirustaudin riskiryhmistä:

A) Potilasryhmät riippumatta saaduista rokotuksista:

- Elin- tai kantasolusiirto 6 kk:n sisällä tai edelleen jatkuva voimakas hylkimisenestolääkitys
- Syöpätauti, johon annetaan solunsalpaajahoitoja tai hoidot ovat päättyneet kuuden kuukauden sisällä (pelkällä leikkauksella tai hormonihoitolla hoidetut syövät eivät kuulu)
- Vaikeat puolustusjärjestelmän häiriöt (esim. synnynnäinen immuunivaje)
- Rituksimabihoitoa saaneet potilaat

B) Potilasryhmät, mikäli potilas on rokottamaton TAI yli 60-vuotias: Vaikea krooninen munuaissairaus

- Vaikea krooninen keuhkosairaus
- Lääkehoitoinen tyyppin 2 diabetes (koskee vain rokottamattomia tai yli 60-vuotiaita, joilla alle 4 rokotusta)
- Downin oireyhtymä

C) Potilasryhmät, mikäli potilas on rokottamaton JA yli 40-vuotias:

- Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
- Vaikea sydänsairaus
- Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
- Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
- Vaikea krooninen maksasairaus
- Tyyppin 1 diabetes
- Lisämunuaisten vajaatoiminta
- Vaikea tai keskivaikea uniapnea
- Merkittävä ylipaino (BMI > 40, rokottamattomalla voidaan harkita myös alle 40-v. potilaalle)

D) Omatoimisesti kotona asuva yli 80-vuotias, joka on saanut alle 4 rokoteannosta

- Erityisesti iäkkäiden kohdalla on lääkärin kuitenkin punnittava lääkkeen haittavaikutusten ja yhteisvaikutusten mahdollisesti aiheuttama lääkehyödyn menettäminen.